

DESCRIPTION D'UN TYPHLOPS NOUVEAU
DÉCOUVERT AU TOGO PAR LE D^r MILLET-HORSIN.

PAR M. PAUL CHABANAUD,
CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Typhlops Milleti nov. sp. — Museau très proéminent, avec un canthus horizontal obtus. Narines inférieures. Rostrale grande, sa portion inférieure aussi large que longue; sa portion supérieure aussi large que la moitié de la largeur de la tête, s'étendant jusqu'au niveau du centre des yeux; son bord postérieur arrondi. Une grande préfrontale et deux supra-oculaires distinctes. 4 labiales supérieures. Nasale complètement divisée, en contact avec les labiales 1 et 2; la fente nasale procédant de la 1^{re} labiale et atteignant la rostrale. Préoculaire un peu moins large que la nasale et moitié moins large que l'oculaire, en contact avec les labiales 2 et 3. Oculaire en contact avec les labiales 3 et 4. Yeux bien distincts en arrière de la suture entre la préoculaire et l'oculaire. 30 écailles autour du corps. Queue plus courte que son diamètre à sa base, terminée par une épine.

Coloration d'un brun rougeâtre assez clair ⁽¹⁾; dessus de la tête noirâtre; cette dernière couleur formant, sur le dessus du corps, des lignes longitudinales passant par les bords latéraux des écailles: la base des écailles étroitement teintée de noirâtre. Dessous uniformément clair.

Longueur totale: 170 millimètres. Diamètre, 5 millimètres, compris trente-quatre fois dans la longueur totale.

Togo; 1 individu.

Type: Collection du Muséum. N^o 1920-21.

La constance, considérée comme absolue, du caractère tiré de l'extension de la fente nasale m'oblige à séparer spécifiquement cette forme de *T. punctatus* Leach, dont elle ne diffère en réalité sous aucun autre rap-

⁽¹⁾ Cette teinte rougeâtre est très vraisemblablement due à une altération accidentelle. L'eau formolée dans laquelle étaient plongés les Reptiles rapportés par le D^r Millet-Horsin attaqua les parois de la boîte métallique qui renfermait cette collection et se teinta fortement de rouille. Plusieurs exemplaires présentent cette même coloration rougeâtre.

port. A ce point de vue, *T. Milleti* est à rapprocher de *T. mossambicus* Peters, dont il se distingue par le nombre de ses écailles (30 au lieu de 24) et par son diamètre un peu plus faible, compris 34 fois au lieu de 30 fois dans la longueur totale.

Le Dr Millet-Horsin, à qui je me fais un plaisir de dédier ce *Typhlops*, a encore recueilli au Togo les espèces suivantes :

Psammophis sibilans Linn., 2 individus. N° 1920-22.

Dispholidus typus Smith, var. D, 1 individu présentant 4 post-oculaires, 187 ventrales et 116 sous-caudales doubles. N° 1920-23.

Dendraspis viridis Hallow., 1 individu. N° 1920-24.